

ДИПЛЕН-ДЕНТА Л

Пленка полимерная стоматологическая самоклеящаяся двухслойная с линкомицином.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02392,
выдано ООО «Норд-Ост», Москва. РФ.

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА

1. к. см пленки ДИПЛЕН-ДЕНТА Л толщиной 0,02-0,06 мм содержит линкомицина гидрохлорида 0,05-0,09 мг.

СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ

ДИПЛЕН-ДЕНТА Л - двухслойная пленка, состоящая из совмещенных гидрофильного и гидрофобного слоев. Предназначена для местного применения. Обладает ярко выраженным спектром антибактериального действия, характерным для линкомицина гидрохлорида, ДИПЛЕН ДЕНТА Л.4 гидрофильной (клеящей) стороны плотно фиксируется на поверхности слизистой оболочки полости рта, раневой, ожоговой и др. поверхностях и сохраняется в течение 6-8 ч.

Наружный (гидрофобный) слой предотвращает выход компонентов планки в полость рта и попадания ротовой жидкости в зону действия пленки. Пленка прозрачна, что позволяет наблюдать за динамикой патологического процесса не снимая ее с области пораженного участка. Наличие наружного защитного слоя позволяет больным в период лечения соблюдать гигиену полости рта в полном объеме.

Применение пленки ДИПЛЕН-ДЕНТА Л при лечении различных инфекционных и воспалительных заболеваний полости рта и десен, операционных ран, ожогов и др. приводит в первую очередь к исчезновению или значительному снижению количества агрессивных видов бактерий. Она оказывает выраженное действие на резидентную микрофлору полости рта. При двухнедельном курсе лечения пародонтита практически полностью исчезают такие агрессивные виды, как *Prevotella melaninogenica*, *Prevotella oralis*, *Fusobacterium nucleatum*, *Fusobacterium necroferum*, *Streptococcus millari*, *Actinomyces* sp., и исчезли клинические признаки воспаления десен. В тяжелых случаях пародонтита при наличии множественной антибиотикорезистентности целесообразно сочетание пленок ДИПЛЕН-ДЕНТА Л С ДИПЛЕН-ДЕНТА М (с метронидазолом), что позволяет эффективно элиминировать такие пародонтопатогенные виды, как *Porphyromonas gingivalis*, большинство бактериоидов и пептострептококков. При микробиологическом контроле процесса регенерации слизистой оболочки в области наложения швов после дентальной имплантации. установлена положительная динамика микробной обсемененности ряда анаэробных видов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Пародонтиты, гингивиты, стоматиты: афтозные, язвенно-некротические и возникшие в результате ношения зубных протезов;

- Другие острые и хронические формы воспаления десен;
- Послеоперационные раны, травмы, ожоги в полости рта и др.
- Послеоперационные раны, травмы, ожоги тела
- Бактериальные поражения кожи

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед началом лечения пленкой ДИПЛЕН-ДЕНТА Л больных обучают рациональной гигиене полости рта, правильному выбору средств ухода за зубами, проводится контрольная чистка. Проводится снятие над и поддесенных зубных отложений и кюретаж по показаниям. Аппликацию пленок проводят следующим образом: отрезают полоску пленки длиной 50 мм и шириной 10 мм (или другого удобного размера) и накладывают с клеящей стороны на десневой край. Как правило, первые 2-3 аппликации проводятся в клинических условиях с одновременным обучением больных технике их самостоятельного применения. Если не требуется специального наблюдения врача, больным для проведения данного этапа лечения предписывают накладывать пленку самостоятельно; рекомендуется ежедневные аппликации пленки в 4 сегментах после чистки зубов 1 или 2 раза в сутки.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ

- Гингивит и пародонтит легкой степени в большинстве случаев для ликвидации воспалительных явлений в тканях десен достаточно проведение 5-8 аппликаций. Контрольные осмотры проводят через 1, 3, 6 и 12 месяцев после окончания курса лечения.
- Пародонтит средней степени тяжести курс лечения пленкой ДИПЛЕН-ДЕНТА Л варьирует в пределах от 6 до 10 дней.
- Пародонтит тяжелой степени применение пленки производится в комплексе с другими пародонтологическими мероприятиями. ДИПЛЕН-ДЕНТА Л накладывается вестибулярно и орально дважды в сутки после утренней и вечерней чистки зубов. Такие процедуры, которые можно было бы назвать предварительными, проводятся в течение 3-4 дней в зависимости от состояния и самочувствия больного. Как правило, этого достаточно для снятия острых воспалительных явлений, резкого уменьшения или прекращения гноетечения из пародонтальных карманов, что позволяет приступить к снятию над и поддесенных зубных отложений и удалению грануляции. Курс лечения пародонтита тяжелой степени составляет в среднем 14-15 дней. Хороший эффект достигается при чередовании ДИПЛЕН-ДЕНТА Л с ДИПЛЕН-ДЕНТА Х и ДИПЛЕН-ДЕНТА М. При комбинированном использовании целесообразно начинать лечение с применением пленок ДИПЛЕН-ДЕНТА М, которая апплицируется на десневой край дважды в день в течение 6-8 дней, а затем накладывается либо ДИПЛЕН-ДЕНТА Л, либо ДИПЛЕН-ДЕНТА Х в течение 7-10 дней.
- Ожоги в первые сутки при ожогах полости рта развивается явление дисбактериоза, проявляющееся в увеличении числа облигатных анаэробов и перераспределении соотношения видов в микробных ассоциациях. Начинают развиваться бациллы и грибок,

что свидетельствует об ослаблении местного иммунитета. На фоне поражения слизистой оболочки полости рта эти изменения еще более выражены.

Пленку накладывают на пораженную поверхность, перекрывая её на 1-2 мм с каждой стороны. Лучший эффект лечения достигается при чередовании с пленкой ДИПЛЕН-ДЕНТА М. Пленочное покрытие за счет прозрачности обеспечивает возможность визуального контроля за состоянием раны без смены повязок. При перевязке оставшуюся часть пленки удаляют.

Профилактика воспалительных осложнений пленка ДИПЛЕН-ДЕНТА Л применяется после хирургических вмешательств на тканях пародонта для подавления патогенной микрофлоры в зоне операции, изоляции и механической защиты послеоперационных ран от внешнего воздействия. Пленку накладывают на 10-12 часов, перекрывая на 1-2 мм поверхность поражения. При перевязке оставшуюся часть пленки удаляют.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

В редких случаях аллергические реакции на компоненты препарата.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

В настоящее время о случаях передозировки препарата ДИПЛЕН-ДЕНТА Л не сообщалось.

УПАКОВКА

В герметичной полиэтиленовой упаковке одна пленка размером 50x100 мм.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Следует хранить пленки в оригинальной упаковке. Оставшуюся после использования часть пленки ДИПЛЕН-ДЕНТА Л снова вкладывают в упаковочный мешочек, вставляют в конверт и хранят в сухом, прохладном, защищенном от света месте. Не следует использовать пленку после истечения срока годности. Пленки с истекшим сроком хранения и с поврежденной упаковкой следует уничтожить. Пленку хранить в недоступном для детей месте.

Производитель препарата

Пленку производит компания «НОРД-ОСТ», г. Москва, РФ.

СРОК ГОДНОСТИ УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

2 года. Указан на упаковке. Отпуск безрецептурный.