

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материала-пасты безмышьяковистой для девитализации пульпы зуба
«ДЕВИТ®» -П
(педодонтической)
по ТУ 9391-062-45814830-2002

НАЗНАЧЕНИЕ

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Материал-паста безмышьяковистая для девитализации пульпы зуба «Девит»-П (педодонтическая) (далее по тексту – материал «Девит»-П) предназначена для девитализации пульпы и мумификации молочных зубов в случаях, когда экстирпацию пульпы можно исключить.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Материал «Девит»-П содержит:

- параформ - антисептик, коагулирующий альбумины, обеспечивая девитализацию пульпы;
- лидокаина гидрохлорид, локально анестезирующий и снижающий опасность возникновения болезненных реакций;
- хлорфенол, камфору и ментол – компоненты, усиливающие антисептическое действие препарата;
- пастообразователь и наполнитель, придающий пасте волокнистую структуру.

Девитализация пульпы временных зубов сопровождается эффективной стерилизацией, что делает возможным не удалять пульпу и избежать болезненной для ребенка процедуры.

ВНИМАНИЕ: Материал «Девит»-П противопоказан для лиц, имеющих повышенную чувствительность к параформу и другим компонентам состава.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.

Очистить полость зуба от кариозного дентина и вскрыть пульповую камеру. В случаях значительного некроза поверхности пульпы, необходимо под аппликационной анестезией снять часть некротизированной пульпы. Небольшое количество материала «Девит»-П (шарик диаметром 1-2 мм) с помощью инструментов поместить без давления на вскрытый рог пульпы и герметично закрыть полость временным пломбировочным материалом «Дентин-паста».

Полная девитализация пульпы происходит за 3-5 дней, после чего необходимо провести постоянное пломбирование. (Если пациент не ощущает боли, постоянное пломбирование возможно уже через 24-48 часов применения материала «Девит»-П.)

ВНИМАНИЕ: При усилении пульпитной боли после наложения пасты (не вскрыт рог пульпы или паста наложена очень плотно) необходимо выполнить инфильтрационную анестезию лидокаином.

Во избежание химического ожога не допускать подтекание препарата на слизистую!

ФОРМА ВЫПУСКА

Паста (шприц) - 3,0 г

Инструкция по применению - 1 шт.

Картонная упаковка - 1 шт.

Допускается выпуск материала «Девит»-П другой комплектности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, в плотно закрытом шприце, при температуре от +5°C до +25°C.

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре от -30°C до +30°C.

Срок годности - 2 года.