

ДИПЛЕН-ДЕНТА К

Пленка полимерная стоматологическая самоклеящаяся двухслойная с клиндамицином.

Регистрационное удостоверение N9 ФСР 2008/02392,
выдано ООО «Норд-Ост», Москва, РФ.

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА

1 кв. см пленки ДИПЛЕН-ДЕНТА К толщиной 0,02-0,06 мм содержит фосфат клиндамицина 0,03-0,05 мг.

СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ

ДИПЛЕН-ДЕНТА К - двухслойная пленка, состоящая из совмещенных гидрофильного и гидрофобного слоев. В гидрофильный слой пленки включен фосфат клиндамицина.

ДИПЛЕН-ДЕНТА К - пролонгированная форма клиндамицина местного действия, предназначена для местного применения стоматологии. Обладает ярко выраженным спектром антибактериального действия, характерным для клиндамицина. По механизму действия и антимикробному спектру клиндамицин близок к линкомицину, но в отношении бактериоидов и неспорообразующих анаэробов, в 2-10 раз превосходит его.

ДИПЛЕН-ДЕНТА К с гидрофильной (клеящей) стороны плотно фиксируется на поверхности слизистой оболочки полости рта, раневой, ожоговой и др. поверхностях и сохраняется в течение нескольких часов.

Наружный (гидрофобный) слой предотвращает выход компонентов пленки в полость рта и попадания ротовой жидкости в зону действия пленки.

Пленка прозрачна, что позволяет наблюдать за динамикой патологического процесса не снимая ее с области пораженного участка. Наличие наружного защитного слоя позволяет больным в период лечения соблюдать гигиену полости рта. Применение пленки ДИПЛЕН-ДЕНТА К при лечении различных инфекционных и воспалительных заболеваний полости рта и десен, операционных ран, ожогов и др. приводит в первую очередь к исчезновению или значительному снижению количества агрессивных видов бактерий.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Пародонтиты, гингивиты, стоматиты: афтозные, язвенно-некротические и возникшие в результате ношения зубных протезов;
- Другие острые и хронические формы воспаления десен;
- Послеоперационные раны, травмы, ожоги в полости рта и др.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед началом лечения пленкой ДИПЛЕН-ДЕНТА К больных обучают рациональной гигиене полости рта, правильному выбору средств ухода за зубами, проводится

контрольная чистка. Проводится снятие над- и поддесенных зубных отложений и кюретаж по показаниям. Аппликацию пленок проводят следующим образом: отрезают полоску пленки длиной 50 мм и шириной 10 мм (или другого удобного размера) и накладывают с клеящей стороны на десневой край. Как правило, первые 2-3 аппликации проводятся в клинических условиях с одновременным обучением больных технике их самостоятельного применения. Если не требуется специального наблюдения врача, больным для проведения данного этапа лечения предписывают накладывать пленку самостоятельно (целесообразно на ночь): рекомендуется ежедневные аппликации пленки в 4 сегментах после чистки зубов 1 или 2 раза в сутки.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ

- Гингивит и пародонтит легкой степени - в большинстве случаев для ликвидации воспалительных явлений в тканях десен достаточно проведение 5-8 аппликаций. Контрольные осмотры проводят через 1, 3, 6 и 12 месяцев после окончания курса лечения.
- Пародонтит средней степени тяжести - курс лечения пленкой ДИПЛЕН-ДЕНТА К варьирует в пределах от 6 до 10 дней.
- Пародонтит тяжелой степени - применение пленки производится в комплексе с другими пародонтологическими мероприятиями. ДИПЛЕН-ДЕНТА К накладывается вестибулярно и орально дважды в сутки после утренней и вечерней чистки зубов. Такие процедуры, которые можно было бы назвать предварительными, проводятся в течение 3-4 дней в зависимости от состояния и самочувствия больного. Как правило, этого достаточно для снятия острых воспалительных явлений, резкого уменьшения или прекращения гноетечения из пародонтальных карманов, что позволяет приступить к снятию над- и поддесенных зубных отложений и удалению грануляции. Курс лечения пародонтита тяжелой степени составляет в среднем 14-15 дней. Хороший эффект достигается при чередовании ДИПЛЕН-ДЕНТА К с ДИПЛЕН-ДЕНТА Г и ДИПЛЕН-ДЕНТА М. При комбинированном использовании целесообразно начинать лечение с применением пленок ДИПЛЕН-ДЕНТА М, которая апплицируется на десневой край дважды в день в течение 6-8 дней, а затем накладывается ДИПЛЕН-ДЕНТА К в течение 7-10 дней.
- Ожоги - в первые сутки при ожогах полости рта развивается явление дисбактериоза, проявляющееся в увеличении числа облигатных анаэробов и перераспределении соотношения видов в микробных ассоциациях. Начинают развиваться бациллы и грибок, что свидетельствует об ослаблении местного иммунитета. На фоне поражения слизистой оболочки полости рта эти изменения еще более выражены. Пленку накладывают на пораженную поверхность, перекрывая её на 1-2 мм с каждой стороны. Лучший эффект лечения достигается при чередовании с пленкой ДИПЛЕН-ДЕНТА Г. Пленочное покрытие за счет прозрачности обеспечивает возможность визуального контроля за состоянием раны без смены повязок. При перевязке оставшуюся часть пленки удаляют.
- Профилактика воспалительных осложнений пленка ДИПЛЕН-ДЕНТА К применяется

после хирургических вмешательств на тканях пародонта для подавления патогенной микрофлоры в зоне операции, изоляции и механической защиты послеоперационных ран от внешнего воздействия. Пленку накладывают на 10-12 часов, перекрывая на 1-2 мм поверхность поражения. При перевязке оставшуюся часть пленки удаляют.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

В редких случаях аллергические реакции на компоненты препарата.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

УПАКОВКА

В герметичной полиэтиленовой упаковке одна пленка размером 50x100 мм.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Следует хранить пленки в оригинальной упаковке. Оставшуюся после использования часть пленки ДИПЛЕН-ДЕНТА К снова вкладывают в упаковочный мешочек, вставляют в конверт и хранят в сухом, прохладном, защищенном от света месте. Не следует использовать пленку после истечения срока годности. Пленки с истекшим сроком хранения и с поврежденной упаковкой следует уничтожить. Пленку хранить в недоступном для детей месте.

Производитель препарата

Пленку производит компания «НОРД-ОСТ», г. Москва, РФ.

СРОК ГОДНОСТИ УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

2 года. Указан на упаковке. Отпуск безрецептурный.